

## AVVISO

Come è noto, si ricreano ogni anno le condizioni favorevoli all'insorgenza del fenomeno di casi di pediculosi nelle classi; in merito al problema la ASL RM/E ha fornito a quest'ufficio gli elementi per dare alle SS. VV. una corretta informazione scientifica al fine di evitare atteggiamenti di pregiudizio e di risentimento nei confronti di bambini e genitori.

Riguardo alla pediculosi va saputo che:

1. le pediculosi dei capelli sono frequenti e in aumento tra i bambini in età scolare;
2. si riscontrano in tutti i gruppi socioeconomici e non sono segni di sporcizia;
3. l'infezione non è influenzata dalla lunghezza dei capelli;
4. il prurito è il sintomo più comune, ma i bambini con l'infestazione lieve non se ne lamentano;
5. i bambini infestati non possono essere allontanati dalla scuola.

### PREVENZIONE E TRATTAMENTO

Il trattamento, anche in via preventiva, consiste nell'uso di prodotti antiparassitari, in commercio sotto forma di shampoo e lozioni. È consigliabile ripetere il trattamento a distanza di 7 - 10 giorni (le uova maturano in una settimana).

L'allontanamento delle uova (lendini) rimaste attaccate ai capelli può essere facilitata dall'impiego di acqua e aceto bianco in parti uguali e con l'utilizzo di un pettine a denti fitti. Per il corretto impiego di tali prodotti antiparassitari attenersi scrupolosamente alle avvertenze riportate nei foglietti illustrativi ovvero consigliarsi con il proprio medico di fiducia.

Tutti i conviventi dovrebbero essere esaminati (dal proprio medico) e trattati se infestati.

Vestiti, lenzuola, giocattoli di tessuto, possono essere disinfettati in lavatrice con cicli caldi a 54 - 55 gradi per almeno 5 minuti; pettini e spazzole possono essere trattati con shampoo antiparassitario o con l'immersione in acqua molto calda per almeno 10 minuti.

## AVVISO

Come è noto, si ricreano ogni anno le condizioni favorevoli all'insorgenza del fenomeno di casi di pediculosi nelle classi; in merito al problema la ASL RM/E ha fornito a quest'ufficio gli elementi per dare alle SS. VV. una corretta informazione scientifica al fine di evitare atteggiamenti di pregiudizio e di risentimento nei confronti di bambini e genitori.

Riguardo alla pediculosi va saputo che:

6. le pediculosi dei capelli sono frequenti e in aumento tra i bambini in età scolare;
7. si riscontrano in tutti i gruppi socioeconomici e non sono segni di sporcizia;
8. l'infezione non è influenzata dalla lunghezza dei capelli;
9. il prurito è il sintomo più comune, ma i bambini con l'infestazione lieve non se ne lamentano;
10. i bambini infestati non possono essere allontanati dalla scuola.

### PREVENZIONE E TRATTAMENTO

Il trattamento, anche in via preventiva, consiste nell'uso di prodotti antiparassitari, in commercio sotto forma di shampoo e lozioni. È consigliabile ripetere il trattamento a distanza di 7 - 10 giorni (le uova maturano in una settimana).

L'allontanamento delle uova (lendini) rimaste attaccate ai capelli può essere facilitata dall'impiego di acqua e aceto bianco in parti uguali e con l'utilizzo di un pettine a denti fitti. Per il corretto impiego di tali prodotti antiparassitari attenersi scrupolosamente alle avvertenze riportate nei foglietti illustrativi ovvero consigliarsi con il proprio medico di fiducia.

Tutti i conviventi dovrebbero essere esaminati (dal proprio medico) e trattati se infestati.

Vestiti, lenzuola, giocattoli di tessuto, possono essere disinfettati in lavatrice con cicli caldi a 54 - 55 gradi per almeno 5 minuti; pettini e spazzole possono essere trattati con shampoo antiparassitario o con l'immersione in acqua molto calda per almeno 10 minuti.